

## ประชาสัมพันธ์สาเหตุ อาการ ของโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันเมื่อถูกสุนัข หรือ แมว กัด-ข่วน คาถา 5 ย.

หากถูกสุนัข แมวกัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย อย่าชะล่าใจ ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันที หลายๆครั้ง นานประมาณ 10 นาที และใส่ยาเบตาดีน เพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อวินิจฉัยและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากฉีดวัคซีนแล้วควรไปตามนัดทุกครั้ง นอกจากนี้ ควรสังเกตสุนัขว่ามีอาการผิดปกติหรือตายใน 10 วันหรือไม่ ภายหลังสุนัขตัวนั้นไปกัดข่วนคน ต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขอให้ยึดหลัก “คาถา 5 ย.” เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้

- 1.อย่าเหยยให้สัตว์โมโหเพราะอาจโดนข่วนหรือกัดได้
- 2.อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว ขา หรือหางของสัตว์
- 3.อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
- 4.อย่าหยิบ จานข้าวหรืออาหารขณะสัตว์กำลังกิน และ
- 5.อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า”

(เอกสารเผยแพร่จาก สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข :

<http://r36.ddc.moph.go.th/r36/document/index/4>)

# โรคพิษสุนัขบ้า



เกิดจากเชื้อ **เรบีส์ไวรัส (Rabies Virus)**  
 มีสัตว์เสี่ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย  
 สุนัข หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค  
**ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย 100%**



## กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า 15 ปี



ถูกกัด ข่วน  
 แผลไม่ใช้วัคซีน

## การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ  กัด  ข่วน  เลียบบาดแผล

## อาการผู้ป่วย



## ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

### ระยะเริ่มแรก

- นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง
- ทงุดทงิด เก็บตัว
- ทวาดระแวง บ้านตาขยาย

### ระยะต้นต้น

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- ทำทอน

### ระยะอันตราย

- น้ำลายไหล
- คางห้อยตก
- สิ้นลง ตาย

## คำแนะนำเมื่อถูกกัด-ข่วน-เลีย



### ล้างแผล

ด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง



### ใส่ยา

เบตาดีน



### กักหมา-แมว

เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน



### หาหมอ

หากฉีดวัคซีนต้องมาตามนัดทุกครั้ง

## คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



### ฉีดวัคซีน

โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



### เลี้ยงในรั้วบ้าน

ออกนอกบ้านต้อง **ใส่สายจูง**



ฝึกให้ **เชื่อฟังคำสั่ง**



ทำหมัน **คุมกำเนิด**

## คาถา

# 5ป.

## กับสุนัขกัด

**ป1** อย่าแหง



ทำให้สุนัขโกรธ

**ป2** อย่าเหยียบ



หาง หิว ตัว ขา  
 ให้สุนัขตกใจ

**ป3** อย่าแยก



สุนัขที่กัดกัน  
 ด้วยมือเปล่า

**ป4** อย่าหยิบ



อาหารที่สุนัข  
 กำลังกิน

**ป5** อย่ายุ่ง



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก  
 หรือไม่มีเจ้าของ



# หยุดเสียงด้วยคาตา 5ย. ป้องกันพิษสุนัขบ้า

1. **อย่าแหย** ให้สุนัขโมโห



2. **อย่าเหยียบ** สุนัขให้ตกใจ

3. **อย่าแยก** สัตว์ที่กัดกัน  
ด้วยมือเปล่า



4. **อย่าหยิบ** แย่งจานอาหาร

5. **อย่ายุ่ง** สุนัขที่ไม่ได้เลี้ยง





กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control



ทำอะไรเมื่อ....  
ถูกสุนัขกัด ช่วน



**ล้างแผล**

ด้วยน้ำสะอาด และสบู่เบาๆหลายๆครั้ง




**ใส่ยา**

เช็ดแผลให้แห้งแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ



**ขังสัตว์**

เพื่อสังเกตอาการ 10 - 15 วัน



**หาหมอ**

เพื่อรักษาและฉีดวัคซีนตามกำหนด

DDC  
กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

สำนักสื่อสารความเสี่ยง  
และต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ  
Bureau of Risk Communication  
and Health Behavior Development



สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422